

الترامادول



www.nrc.ae
8002252



الترامادول

الترامادول

الترامادول من الأدوية المسكنة للألم ويستخدم طبيياً لتخفيف الألم بعد العمليات الجراحية أو بعض الأمراض مثل الإنزلاق العنقوي وغيرها.

لماذا يساء استخدام الترامادول؟

انتشرت في الآونة الأخيرة وخاصة بين المراهقين والشباب ظاهرة الإدمان على الترامادول، و أحد من أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة سوءة الحصول عليه نسبياً مقارنة بغيره من المواد المخدرة وكذلك الاعتقاد بلى الترامادول دواء لا يمكن أن يسبب أو أخطار أو مضاعفات جانبية ويمكن للشخص أن يتوقف عنه متى أراد، وجميع هذه الاعتقادات خاطئة.

ويجزم قانون دولة الإمارات العربية المتحدة حيازة أو تناول عقار الترامادول دون وجود وصفة طبية معتمدة، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة أربع سنوات.

لماذا يسبب الترامادول الإدمان؟

الترامادول أحد مشتقات المورفين، وعند تناوله باستمرار فإن الجسم يتوقف عن إفراز مادة الأندورفين والتي تساعد على مقاومة الألم، وبالتالي فإن مريض الإدمان على الترامادول يجد صعوبة كبيرة في التوقف عن استخدام هذا الدواء ويشعر بالألم كثيراً إذا توقف عن تناوله في هذه الحالة، بل وأنه يضطر لتجريبها لأخذ جرعات إضافية من هذه المادة.

الآثار الجانبية للترامادول:

- الصداع والغثبان.
- التشنجات.
- صعوبة التنفس (قد يؤدي إلى الوفاة في حالات الجرعات الزائدة).
- خلل في وظائف الكبد والكلى.
- فقدان الشهية.
- انخفاض الجنس الحد الذي يصعب علاجه.
- الاكتئاب والحمول.
- قد يؤدي إلى تشوهات خلقية للجنين إذا تم إستعماله خلال فترة الحمل.

هل يمكن التوقف عن تناطح الترامادول؟

يعتمد على الفترة الزمنية التي كان يتم فيها تناطح هذه المادة والكميات التي كان يتم إستخدامها.

يشكل عام، التوقف عن تناطح الترامادول فجأة قد يسبب ظهور الأعراض الانسحابية مثل ارتفاع ضغط الدم، صعوبة في التنفس، الحمول، الأرق وكوابيس، تقلبات الحالة في المزاج، وتدل ما يميز الترامادول هو خطورة الإدمان على الترامادول بعلاج هذا المرض تحت إشراف طبي وفي مراكز علاجية متخصصة.

للتردد بالإتصال بنا على الهاتف المجاني: 8002252.